48 20

HAYAS DERRIBADAS


El ciclón Xynthia fue un ciclón de latitudes medias que se originó en el océano Atlántico, entre los días 26 y 28 de febrero del año 2010, alcanzando los vientos generados una velocidad del orden de 180 km/h en algunos puntos. El ciclón Xynthia experimentó un proceso de ciclogénesis explosiva a su paso por Madeira en su avance hacia el este ahondándose la depresión.

Los vientos fueron especialmente fuertes en aquellos lugares montañosos desprotegidos, como lo es, por ejemplo, el lugar donde el viento derribó medio centenar de hayas trasmochas situadas en la falda del Amboto, al sur del municipio vizcaíno de Atxondo, cerca del límite con el Territorio Histórico de Álava y del núcleo rural de Arrazola.

Algunos ejemplares del bosque lograron sobrevivir al fuerte viento, tal y como queda constatado en la comparación entre las ortofotos de los años 2009, anterior al ciclón y de 2015. En esta última se aprecian perfectamente las hayas, muertas, sin hojas, en el suelo. Todas ellas están dispuestas en la misma dirección (NW-SE) y con los cepellones de raíces al aire claramente visibles.



Situación de las hayas derribadas con relación al núcleo urbano de Arrazola y del Anboto.



Ortofoto 2014. Emplazamiento de las hayas en la ladera del Anboto.
Fuente: Google Earth.



Ortofoto 2009. Fuente Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco; geoEuskadi. Grupo de hayas antes del paso del ciclón.



Ortofoto 2014. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco; geoEuskadi. Instituto Geográfico Nacional.
UTM 30N ETRS89 // X: 533318 m // Y: 4770121 m // Z: 827 m.
Grupo de hayas derribadas por el viento.